

บทที่ 17

สารพัน ปัญหาตา บ่ารู้



มีคำภาษาเกี่ยวกับเรื่องตามากมาย ที่ค้างคาวใจอยู่
แต่ไม่รู้ว่าจะไปกามหาคำตอบจากใคร เพื่อไขข้อข้องใจ
ในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตาของหลาย ๆ งานจึงรวบรวม
รวมปัญหาที่หลายท่านอยากรู้ แต่ไม่รู้จะถามใครให้มา
หาคำตอบได้ทั้งนี้



គុងតារាបៀន ហប្តាតាំងខុងក្រុងទី

เรามักก็ได้ยินคนพูดว่า “ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ” แต่ในความเป็นจริงนั้น ดวงตาเป็นมากกว่าหน้าต่างของหัวใจ เป็นหน้าต่างของชีวิต เพราะท่านทราบหรือไม่ว่า เรากำลังตรวจสอบความผิดปกติของร่างกายหลายอย่างจากการตรวจตา เช่นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานจะประสาทชา โรคหัวใจบางชนิด หรือแม้กระทั่งโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง นอกจากนั้น ดวงตา ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ทำให้เราเห็นโลกได้อย่างชัดเจนและสวยงาม ดังนั้นเราทุกคนควรดูแลดวงตาของเราราบีอย่างดี เพื่อให้ดวงตาของเราทำหน้าที่เป็นหน้าต่างของหัวใจต่อไป

ໂຮຄໄປ້າຫວາບຂັ້ນຕາ

ภาวะเปาหวานขึ้นจ่อประสาทตา เป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเปาหวานที่พบได้บ่อยและมีความรุนแรง อาจถึงขั้นทำให้ตาบอดได้ โดยสามารถพบได้ในผู้ป่วยเปาหวานทั้งชนิดที่พบในเด็กและผู้ใหญ่

ปัจจัยเลี่ยงของภาวะนี้ขึ้นกับระยะเวลาที่เป็นเบาหวานและความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยในระยะแรกอาจไม่มีการผิดปกติใดๆ เลย แต่เมื่อมีความผิดปกติของจุลประสาทมากขึ้นจะต้องได้รับการรักษาโดยการยิงเลเซอร์เพื่อป้องกันตาบอดอย่างถาวร ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดและผู้ที่มีภูกานครรได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์เป็นระยะตามที่แพทย์นัด

อาหารกับดวงตา

หลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องการกินผักบุ้งทำให้สายตาดี ซึ่งก็มีส่วนจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง โดยผักหลายชนิดเป็นแหล่งของวิตามินต่างๆ ที่สำคัญกับดวงตา เช่นวิตามินเอ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสารในจอประสาทตา (หรือเรตินา) ช่วยให้จอประสาทตาทำงานที่ในการมองเห็นได้เป็นปกติ นอกจากนั้นในเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ขาดวิตามินเอ อาจทำให้เกิดอาการตาแห้งอย่างรุนแรง เรียกว่าโรคเกล็ดกระดิ่งที่บริเวณเยื่อบุตาขาว ทำให้มีอาการคื่องตาได้ ดังนั้น การรับประทานผักเพื่อให้ได้รับวิตามินเพียงพอ เป็นวิธีหนึ่งในการช่วยรักษาสุขภาพตาของเรารา ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ຮູ້ໄດ້ອ່ຍ່າງໃຣວ່າ **ລຸກມອງເກີບ** ແຮ້ອນໄມ້

พ่อแม่มือใหม่มักมีปัญหาอยู่ในใจเสมอว่า “ลูกน้อยของเรา มองเห็นปึกติดหรือเปล่านะ” ข้อแนะนำในการตรวจตาลูกเป็นทันด้วยตนเองคือ ท่านสามารถลองมองเวลาลูกของท่านลืมตาไว้ ตามีลักษณะปกติ ไม่มีลักษณะผิดปกติของตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้าง เช่น ไม่มีลูกตา ลูกตาเล็ก กระจกตาดำช้ำนหรือเป็นลีข้าว หรือมีขนาดกระจากตาดำใหญ่หรือเล็กผิดปกติหรือไม่ถ้าปักติดគรรรออกสังเกตจนอายุประมาณ 2-3 เดือน เด็กมักเริ่มจ้องหน้าพ่อแม่หรือคนคุ้นเคยได้ หากยังสงสัยว่าลูกน้อยมองเห็นไม่ปักติด ก็พาไปตรวจกับจักษุแพทย์ได้ เพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่



ลูกตาเป็นเดียวทำอย่างไรดี

ร่องที่หนังตาหรือที่เรียกว่าชั้นของตา เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ บริเวณเปลือกตาบน ในคนผิวขาวมักมองเห็นร่องตาสองชั้นชัดเจนกว่าในคน เอเชียติ่งอาจไม่มีร่องตาสองชั้น หรือมีเพียงร่องบางๆ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก อาจยังสังเกตไม่เห็นร่องตาสองชั้นเด่น โดยมักมองเห็นร่องตาชัดเจนขึ้น เมื่อเด็กโตขึ้น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่สังเกตว่าลูกไม่มีร่องตาสองชั้นจึงยังไม่ ต้องกังวล ควรรอจนเด็กโต มักมีร่องตาเห็นชัดเจนขึ้นหรือสามารถทำ คลายกรรมได้ต่อไป

เด็กป่วยตาบวม

เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเด็ก สาเหตุการขยายตาบวมในเด็กมีได้ หลายสาเหตุ อาทิ เช่น มีการระคายเคืองในตา จากลิ่งแบล็ปลอมลงในตา ภูมิแพ้ขึ้นตา อาการทางระบบประสาท (พบได้น้อยในเด็ก) หรืออาจเกิดจาก พฤติกรรมเลียนแบบของเด็ก ดังนั้นท่านควรให้ความสนใจ พูดคุยกับเด็กถึง ปัญหาและสาเหตุที่เด็กขยายตาบวม ถ้าไม่สามารถหาสาเหตุหรือแก้ไขให้หาย เองได้ จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้การดูแลรักษาต่อไป

เด็กปอดศีรษะ

ภาวะปอดศีรษะในเด็ก อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สาเหตุจาก สายตาผิดปกติ สาเหตุจากโรคทางระบบประสาท สาเหตุจากความเจ็บป่วย ทางภายใน (เช่น ไข้หวัด) สาเหตุจากพฤติกรรม (เช่นการพักผ่อนไม่เพียงพอ) สาเหตุจากลิ่งแวดล้อม (เช่นอาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) ดังนั้นมีเด็ก มีปัญหาปอดศีรษะ ผู้ปกครองควรให้ความสนใจ และร่วมหาสาเหตุของ

อาการปอดศีรษะนั้น หากอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง หรือมีลักษณะอันตราย เช่น ปอดศีรษะร่วมกับอาการแขนหรือขาอ่อนแรง มีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ท่านควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัย

เด็กควรดู TV ห่างแค่ไหนดี

คำถามนี้เป็นคำถามยอดนิยมของคุณพ่อคุณแม่ คำตอบที่ถูกต้องคง ต้องขึ้นกับขนาดของห้องและจอโทรทัศน์ที่สัมผัสนี้เหมาะสมกัน คือถ้าจะ โทรทัศน์มีขนาดใหญ่และห้องมีพื้นที่กว้าง ควรพยายามให้ลูกนั่งห่างๆ จอ โทรทัศน์ เพื่อลดการใช้สายตาเพ่งดูโดยไม่จำเป็น แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรให้ ลูกนั่งดูจอโทรทัศน์ใกล้กว่าระยะ 6 ฟุต เพราะการเพ่งดูจอโทรทัศน์ในระยะ ใกล้จะทำให้เด็กปวดตาและปวดหัวได้ นอกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ควร เลือกสรรรายการที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและหาเวลาแห่งดูโทรทัศน์ร่วมกันและ อธิบายสิ่งต่างๆ ให้เด็กฟัง จะทำให้การดูโทรทัศน์ในครอบครัวได้รับความสนุก อบอุ่นและมีประโยชน์ต่อเด็กๆ ยิ่งขึ้น

เด็กเป็นตาภูมิแพ้

เด็กมักเป็นตาภูมิแพ้บ่อยกว่าผู้ใหญ่ เป็นได้ทั้งตาซ้ายและตาขวา เปลือกตาบนและเปลือกตาล่าง ลับกันเป็นหรือเป็นพร้อมๆ กัน สาเหตุส่วน ใหญ่เกิดจากเด็กเล่นในบริเวณที่มีฝุ่น เมื่อเด็กใช้มือที่ไม่สะอาดขยี้ตา ทำให้ ต้มไขมันบริเวณเปลือกตาอุดตันและอักเสบกลâyเป็นตาภูมิแพ้ ดังนั้นถ้าไม่ อยากให้เด็กๆ ของท่านเป็นตาภูมิแพ้บ่อยๆ ต้องพยายามอย่าให้เด็กเล่น บริเวณที่มีฝุ่นมาก และสอนไม่ให้ใช้มือขยี้ตาบ่อยๆ จะลดปัญหาการเป็นตา ภูมิแพ้ลงไปได้มากที่เดียว

ของเล่นกับการพัฒนาสายตา

การใช้ของเล่น เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาของเด็กทั้ง เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและสายตา โดยของเล่นเด็กนอกจากต้องทำจากวัสดุ ที่มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแล้ว ของเล่นที่ดียังควรมีสีสดใส จะช่วยกระตุ้นทักษะทางการมองของเด็ก นอกจากนั้นเมื่อเด็กโตขึ้น ควร เลือกของเล่นที่มีลีลาและรายละเอียดมากขึ้น จะทำให้เด็กสามารถฝึกการใช้ สายตาในการมองสิ่งต่างๆ ที่มีความละเอียดได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

พ่อแม่ควรพาลูกน้อยไปตรวจตาหรือไม่

ในภาวะปกติคุณพ่อคุณแม่มักไม่ได้นึกถึงความจำเป็นในการพาลูก น้อยไปพบจักษุแพทย์ แต่ในบางกรณี ลูกน้อยอาจมีความจำเป็นต้องพบจักษุ แพทย์ เช่น

1. ลูกคลอดก่อนกำหนด เช่น น้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2000 กรัม หรือคลอดก่อนอายุครรภ์ 7 เดือน ควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจจสอบร่างกาย ไม่ซักว่ามีอายุประมาณ 4 สัปดาห์

2. เด็กไม่ยอมจ้องหน้าพ่อแม่ หรือมีตาลั้นผิดปกติ เมื่ออายุตั้งแต่ 2-3 เดือนขึ้นไป

3. สงสัยว่าเด็กมองเห็นไม่ชัด เช่น อายุน้อย ที่ยังไม่สามารถดูโทรทัศน์ ใกล้ๆ หรือกระพริบตาบ่อย

4. มีประวัติสายตาลั้นมากของพ่อหรือแม่ หรือมีประวัติโรคตาที่อาจ ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ในครอบครัว เช่น โรคมะเร็งจอประสาทตา โรคต้อ กระจกแต่กำเนิด หรือโรคต้อหินแต่กำเนิด เป็นต้น

เกมออนไลน์กับปัญหาสุขภาพ

การที่เด็กเล่นเกมออนไลน์ มากทำให้เกิดปัญหาด้วยการใช้คอมพิวเตอร์มากเกินไป ซึ่งมีข้อควรระวังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ

1. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สายตา เนื่องจากการใช้สายตาเพ่งจอ คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการเสบตา เดื่องตาและปวดรอบดวงตาได้ คำแนะนำในการป้องกันปัญหาดังกล่าวคือควรใช้คอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดหรือจ้าเกินไป รวมถึงการพักสายตาเป็นระยะๆ จะสามารถลดอาการปวดรอบดวงตาหรือปวดศีรษะได้

2. ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ควรให้ความสำคัญกับการทำแห่งการนั่งให้พอเหมาะสม การวางข้อมือเพื่อใช้เมาส์เล่นเกม ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สบาย และเมาสมีขนาดไม่เล็กหรือใหญ่จนต้องเกร็งมืออยู่ตลอดเวลา

3. ปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาระบบทองต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก เพราะอาจทำให้เด็กหลงเหลือเรียน หรืออาจมีพัฒนาระบบทองต์รุนแรงจากการเล่นเกมได้ นอกจากนั้นผู้ปกครองควรให้ความสนใจให้เด็กมีความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวและในโลกแห่งความจริง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างเหมาะสมมากกว่า

ปัญหาสีปฏิกิริยาเวลาดูแสงแดด

อาการเสบตาเวลาโดนแดด อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น โรคต้อลม จะมีอาการเสบตา ตาแดงเวลาถูกสิ่งระคายเคือง เช่น ลม ฝุ่น หรือแสงแดด โรคตาแห้ง มาก มีอาการเสบตา รู้สึกฝืดตา อาจเป็นมากในช่วงบ่าย หรือเย็น หรืออาจไม่มีสาเหตุของโรคที่ชัดเจน แต่ถ้าอาการเป็นมาก ควรรับการตรวจและปรึกษาจากแพทย์



ໂຣຄຕາແກ່ງ

โรคตาแห้งคือภาวะที่น้ำหล่อลื่ยงลูกตาไม่อยู่ลงกว่าปกติ อาจพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อาจเกิดจากการขาดวิตามินอี หรือเกิดจากความผิดปกติของตาในการสร้างน้ำหล่อลื่ยงตาลดลง หรืออาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิด เช่นยาหยดแก้คื่องตาหรือยาคินแก๊เพ็ปเป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้อาจพบในผู้ที่เพ่งใช้สายตาเป็นเวลานาน เช่น การเพ่งโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์

ໂຮມຕາບອດສີ

تابอดสีเป็นภาวะที่อาจเป็นแต่กำเนิดหรือมาเป็นภายหลังก็ได้ โดยภาวะatabอดสีแต่กำเนิดมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยส่วนมากมักเป็นภาวะatabอดสีเขียวและแดง แต่ยังสามารถพบของสีอื่นๆ ได้ ดังนั้นจึงยังสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติแต่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือกิจกรรมบางประเภท เช่น นักคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คนขับรถ, คนงานโรงงานอุตสาหกรรมหรือนักเคลื่อนตั้น ดังนั้นหากท่านสงสัยว่าบุตรหลานของท่านมีปัญหาเรื่องatabอดสี จึงควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

ค้นหา..กำอย่างไรดี

ໂຮມເນື້ອຍຕາ

โรคเมื่อยตา เกิดจากการเพ่งใช้สายตามากเกินควร โดยการใช้สายตาต่อเนื่องยาวนาน หรือการใช้สายตาในที่มีแสงสว่างไม่พอ ดังนั้นในผู้ที่เป็นต้องใช้สายตามากเป็นประจำ เช่น นักคอมพิวเตอร์ พนักงานพิมพ์ดีด ควรจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ และเมื่อใช้สายตาต่อเนื่องประมาณ 15-20 นาที ควรทำการพักสายตาโดยการมองออกไปที่ไกลๆ เช่นนอกหน้าต่างประมาณ $\frac{1}{2}$ -1 นาที เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา จะช่วยลดอาการปวดตาลงได้มาก

ใช้สายตามาก แล้วปัดตา

ในภาวะที่มีการใช้ส่ายตามากอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้มีอาการปวดตาหรือปวดศีรษะเกิดขึ้นได้ โดยอาการปวดตาหรือปวดศีรษะนั้นมักลามพันธ์กับการใช้ส่ายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีปัญหาสายตาล้า การใส่แว่นที่มีขนาดสายตาล้านมากกว่าที่เป็นจริง จะทำให้เกิดอาการปวดตาได้ง่ายกว่าปกติ



นอกจากนั้นในผู้ที่ป่วยตาหรือศรีษะจากการใช้สายตา ต้องไม่มีอาการผิดปกติอื่นร่วมเช่น มีแขนขาหรืออ่อนแรง หากหันมือการปวดศรีษะรุนแรงโดยไม่สัมพันธ์กับการใช้สายตา หรือมีอาการผิดปกติอื่นร่วมด้วย ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

แสงอาทิตย์กับดวงตา

แสงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงในช่วงความถี่ต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ทำให้เราสามารถมองเห็นลึกลงต่างๆ ได้อย่างชัดเจน แต่ในบางช่วงความถี่ของแสงในแสงอาทิตย์ อาจทำให้เกิดภาวะกระจกตาอักเสบ โรคจอประสาทตา รวมทั้งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต้อลมหรือต้อเนื้อได้ ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สายตาในที่ที่แสงแเดดจำากเกินไป โดยเฉพาะห้ามใช้สายตามองดวงอาทิตย์โดยตรง เพราะอาจทำให้จอประสาทตาเสียอย่างถาวรสิ่ง

ปัญหาน้ำตา

ขนตาที่มีตาพูดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยอาจเป็นความผิดปกติของขนตาเพียงบางเล็กน้อย หรือขนตาหั้งแพงก์ได้ อาการจะทำให้มีอาการระคายเคืองตา มีน้ำตาไหลในตาข้างหนึ่ง วิธีการรักษาทำได้โดยการถอนขนตาเล็กน้อยที่เป็นสาเหตุ หากขนตาเล็กมาก (เรียกว่าขนตาน้ำ) อาจมองเห็นได้ยาก การใช้วิธีถอนขนตามากมีปัญหาน้ำข้นขึ้นซึ่งใหม่ ในระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ การรักษาโดยการจี้รุขันตาด้วยไฟฟ้าโดยจักษุแพทย์ อาจทำให้ปัญหาน้ำตาทิ่มตาหายขาดได้

ขั้นตอนการรักษา

ในเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นตาแดง ลักษณะ และปริมาณของขี้ตาสามารถออกส่าเหตุของโรคตาแดงนั้นได้ เช่นในกรณีมีขี้ตาเป็นลักษณะหนืดๆ ไม่มีสี เป็นๆ หายๆ พร้อมกันทั้งสองตามากเกิดจากปัญหาภูมิแพ้ที่เยื่อบุตา ถ้าขี้ตาไม่ลักษณะเป็นน้ำตาใสๆ ออกมาก มีอาการเคืองตาร่วมด้วย มักเป็นโรคตาแดงจากเชื้อไวรัสซึ่งสามารถติดต่อ กันได้อย่างรวดเร็ว จากตาหนึ่งไปสู่อีกตาหนึ่ง หรือหากขี้ตาไม่ลักษณะเป็นสีเหลืองหรือเขียวกรุอะกรังตา โดยเฉพาะตอนเช้าอาจทำให้ลิมตาไม่ชี้นิ้น น่าจะเป็นโรคตาแดงจากเชื้อแบคทีเรีย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อใช้ยาปฏิชีวนะหยดตา อาการจะหายเป็นปกติในเวลา 2-4 วัน

โรคตาแดงไม่มีภูมิคุ้มกัน

โรคติดเชื้อบางโรค เมื่อเป็นแล้วครั้งหนึ่งจะไม่เป็นอีกตลอดชีวิต เช่น โรคหัด โรคอีสกอวิส แต่สำหรับโรคตาแดงทั้งชนิดที่เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ไม่ทำให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันทางต่อการติดเชื้อ ดังนั้นแม้จะเคยเป็นโรคตาแดงแล้ว หากไปได้รับการสัมผัสเชื้อมาอีก อาจทำให้เป็นโรคตาแดงซ้ำได้ ดังนั้นวิธีป้องกันโรคตาแดงที่ดีที่สุดคือ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสตา เพราะอาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคตาแดงได้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสตาผู้ป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม การใช้สิ่งของที่อาจสัมผัสรเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้าหรือยาหยดตารวมกัน จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะทำให้หันปลอกภัยจากโรคตาแดง



การเปลี่ยนgrade ไม่ใช่การเปลี่ยนดวงศตา

ในภาวะที่มีความผิดปกติของกระจกตาหลายโรค เช่น แพลเป็นที่กระจกตา แพลเป็นหนองที่กระจกตา ในบางกรณีการรักษาที่สามารถทำได้คือการเปลี่ยนกระจกตา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเฉพาะบริเวณกระจกตาด้านล่างหน้าที่มีลักษณะเส่า เท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ตาเลี้ยวจากโรคอื่นๆ เช่นเชื้อไวรัส ขึ้นจ่อประสาทตา จ่อประสาทตาลอก วิทยาการทางการแพทย์ในปัจจุบันยังไม่สามารถเปลี่ยนลูกตาทั้งลูกและเลี้ยงประสาทตาได้ ดังนั้นเราจึงควรดูแลสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงโรคตาที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

โรคตาส่อوب

โรคตาส่อนหรือโรคตาเขتاเหล' เป็นโรคที่พบได้ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ โดยอาจเกิดขึ้นเองจากการทำงานผิดปกติของกล้ามเนื้อตาหรือสายตา เกิดขึ้นหลังจากประสบอุบัติเหตุที่ดวงตาหรือสมอง หรือเกิดจากโรคของร่างกายบางโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงหรือหลังการติดเชื้อไวรัสบangsnid หรือเกิดในผู้ที่มีตาข้างหนึ้นบอดหรือสายตาเลือนรางมากก็ได้ ในเด็กสาเหตุส่วนใหญ่อาจเป็นจากสายตาผิดปกติ ดังนั้นแนวทางการรักษาขั้นตอนแรกมักเริ่มด้วยการพับจักษุแพทย์เพื่อหยุดยาและรัดสายตา หากตาเข้าจากสายตาผิดปกติ การรักษาโดยการใส่ว่นจะสามารถทำให้ตากลับมาตรงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด แต่ถ้าสาเหตุไม่ได้เกิดจากสายตาผิดปกติหรืออาการไม่ดีขึ้นหลังจากใส่ว่นจะประยุกต์ที่น้ำ แนะนำการรักษาต่อไปจึงจะพิจารณาผ่าตัดกล้ามเนื้อตา

เป้า มา กับ เลข 4

ปัญหาที่มีนุชช์(เกือบ)ทุกคนต้องเผชิญกับความจำคำนี้เมื่ออายุมากขึ้น เวลาจะอ่านหนังสือหรือมองอะไรใกล้ๆ ต้องค้นหาแวนสายตาตามมาใส่ จึงจะมองเห็นได้ ปัญหานี้เกิดจากภาวะปกติของสายตามนุชช์ เมื่อต้องการมองวัตถุที่อยู่ในที่ไกล จะต้องมีการเพ่งตา โดยการเปลี่ยนรูปร่างของเลนส์ในตาโดยอัตโนมัติ ซึ่งความสามารถในการเพ่งนี้จะมากที่สุดในเด็ก และลดลงตามอายุ จนอายุประมาณ 40 ปีจะไม่สามารถเพ่งได้พอจะอ่านหนังสือได้ ต้องใช้แวนสายตาช่วย โดยคนที่เคยสายตาสั้นอยู่เดิม อาจต้องพึ่งแวนหนังสือชากว่า 40 ปีเล็กน้อย แต่ถ้าคนที่มีสายตาอยู่เดิม อาจต้องใช้แวนหนังสือตั้งแต่ก่อนอายุ 40 ปี เพราะความสามารถในการเพ่งที่ลดลงตามอายุ ด้วยเหตุผลนี้ “มัน (จึง)มา กับ เลข 4(ลีบ)” นั่นเอง

สายตากลับ..ดีจริงหรือ?

สายตากลับ หมายถึง ในการนี้ผู้ที่มีปัญหาสายตาในคนอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จะมองไกลชัดเจนแต่เมื่อมองใกล้ไม่ชัด จำเป็นต้องใช้แวนสายตาอ่านหนังสือ แต่ต่อมาเมื่อมีอายุมากขึ้นอีก บางคนอาจสามารถกลับมาอ่านหนังสือได้ โดยไม่ต้องใช้แวนอ่านหนังสือ เรียกว่าภาวะสายตากลับ ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากตาเริ่มมีปัญหาต้อกระจกในระยะแรก ทำให้เกิดลักษณะของสายตากลับได้ ดังนั้นมีเริ่มมีสายตากลับ แนะนำให้ไปพบจักษุแพทย์เพื่อรับการดูแลและคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป



สิ่งแปรปรวนเข้าตา

เมื่อมีอาการเดื่องตากจากสิ่งแปรปรวน เช่นฝุ่นหรือปีกแมลงปลวเข้าตา ควรหลีกเลี่ยงการขี้ต้า เพราะจะทำให้สิ่งแปรปรวนนั้นฝังลงในกระจกตา การดูแลรักษาที่ถูกต้องคือควรลีมตาให้น้ำสะอาดเพื่อให้สิ่งแปรปรวนหลุดออกมานอกตาไม่สามารถหาได้ สะอาดได้ในขณะนั้น ให้ใช้วิธีการพิรบตา เพื่อให้น้ำตาไหลออกมากลางสิ่งแปรปรวนออกไปได้เอง แต่ถ้าอาการเดื่องตาไม่หายอาจเกิดจากตาถลอกหรือยังมีสิ่งแปรปรวนฝังอยู่ในกระจกตา ไม่ควรพยายามใช้วัสดุใดเชี่ยกร่องตา เพราะอาจเป็นอันตรายมากขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อเขี่ยสิ่งแปรปรวนออกจะปลอดภัยกว่า

สารเคมีระดับเข้าตา

อันตรายที่เกิดจากสารเคมีเข้าตา พบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อาจเกิดจากอุบัติเหตุ เช่น น้ำกลั่นแบบเตอร์ น้ำกรดหรือโซดาไฟกระเด็นเข้าตา หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เช่นยาหม่องน้ำไหลเข้าตา มักทำให้เกิดอาการปวดแสบตาอย่างรุนแรง ลีมตาไม่ค่อยขึ้น มีน้ำตาไหลมาก วิธีการดูแลเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด คือการใช้น้ำสะอาดล้างตาที่ถูกสารเคมีให้เร็วที่สุดและมากที่สุด เมื่อล้างตาแล้วหากยังมีอาการเดื่องตาอยู่ หรือมีอาการรุนแรงควรรีบนำส่งแพทย์พร้อมตัวอย่างสารเคมีที่เข้าตาโดยเร็วที่สุด เพื่อรับการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ลูกเล่นกับสัตว์เลี้ยง..ต้องระวัง

ภาวะอุบัติเหตุกับดวงตาที่เกิดขึ้นในเด็ก บ่อยครั้งอาจเกิดจากการเล่นกับสัตว์เลี้ยงในบ้านได้อย่างคาดไม่ถึง เช่นการปล่อยให้เด็กเล่นกับสุนัขตามลำพัง เด็กอาจถูกสุนัขกัดบริเวณเปลือกตา ทำให้เปลือกตาฉีกและอาจทำให้ห่อน้ำตาขาดได้ โดยหากไม่ได้รับการเย็บซ่อมอย่างถูกวิธีอาจทำให้เด็กมีปัญหาน้ำตาข้างนั้นไหลไปตลอดชีวิตได้ หรือในเด็กบางคนที่เล่นกับไก่หรือนกที่มีปีกแหลม อาจถูกสัตว์นั้นจิกกระจาด ทำให้กระจาดแตก ซึ่งแม้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็มักมีผลให้เด็กสูญเสียความสามารถในการมองเห็นของตาข้างนั้นไปมากก็น้อย ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ควรดูแลระมัดระวังในการเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเด็กให้เป็นไปอย่างปลอดภัยจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

อุบัติเหตุกับบินดินตก

ในปัจจุบันกฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่และผู้เดินทางบนถนนของรถทุกคันต้องคาดเข็มขัดนิรภัย นับเป็นวิธีป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคะเน เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หากผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากการเหวี่ยงของรถ ทำให้ตัวหลุดออกจากปืนอกรถ เกิดอันตรายต่อกระดูกคอ หรือที่พบได้บ่อยๆ คือหน้าและศีรษะกระแทกับกระյกรถ ทำให้กระյกรถทำอันตรายต่อตาหั้ง 2 ข้าง ซึ่งมักไม่สามารถรักษาให้สามารถกลับมาของเห็นได้ดังเดิม นอกจากนั้นในเด็กเล็กๆ ไม่ควรปล่อยให้นั่งด้านหน้าข้างคนขับ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ยิ่งกว่า ควรได้รับการอุ้มและอยู่ที่ห้องโดยสารส่วนหลังรถจะได้รับความปลอดภัยหากเกิดอุบัติเหตุได้ดีกว่าการนั่งอยู่ด้านหน้าของห้องโดยสาร



การใช้ยาหยดตา

โดยทั่วไปการหยดยาหยดตา ควรหยดเพียงครั้งละ 1 หยดต่อตา หนึ่งชั่วโมง เพราะในบริเวณอุ้งตาสามารถรับยาได้เพียง $\frac{1}{2}$ หยดเท่านั้น ดังนั้น การหยดยาที่ถูกต้อง ในการนี้ที่ต้องหยดยาเอง คือ ควรล้างมือให้สะอาด และน้ำบริเวณหน้ากระจก เงยหน้าเล็กน้อย ถือขวดยาในมือข้างที่ถานด์ แล้ว ใช้มืออีกข้างแหงนๆ เวลาเปลี่ยนถ่ายยา แล้วถอดถุงหุ้มยา หลังจากนั้นจึงหยดยา เพียง 1 หยดให้เข้าตา ถ้ายาเข้าตาแล้วไม่จำเป็นต้องหยดยาที่สอง เพราะ เป็นการเปลี่ยนยาโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนั้นการนี้ที่ต้องหยดยา 2 ชนิด ในเวลาเดียวกัน ควรรอหยดชาวดที่ 2 หลังจากหยดชาวดแรกแล้ว 5 นาที เพื่อให้ยาสามารถซึมเข้าตาได้ทั้งสองชนิด

การใช้ยาป้ายตา

ยาป้ายตาหรือยาขี้ผึ้งสำหรับป้ายตา มีข้อดีคือยาจะสัมผัสถูกตาได้นานกว่าการใช้ยาหยดยา แต่มีข้อเสียที่สำคัญคือจะทำให้ตาบวม และรู้สึกเหนื่อยหนาแนتا ดังนั้นยาขี้ผึ้งป้ายตาจึงนิยมใช้ในช่วงก่อนนอน เพราะยาสามารถอยู่ในตาได้ตลอดเวลานอน และจะไม่รู้สึกตาบวมเมื่อการป้ายในช่วงกลางวัน สำหรับวิธีเก็บยาป้ายตาควรเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมด้า และควรสังเกตวันหมดอายุของยา เพราะการใช้ยาที่หมดอายุ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ยังอาจเป็นโทษต่อผู้ใช้ยาได้

ยาหยดตาเก็บได้นานแค่ไหน

คำถามที่มักได้รับอยู่บ่อยๆ คือ ยาหยดตาเปิดใช้แล้ว ต้องเก็บรักษาอย่างไร และสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานแค่ไหน เพราะยาหยดตาบางชนิด ใช้เฉพาะเมื่อมีอาการ ผ่านไป 1 เดือนยังเหลือเกือบเต็มขวด ต้องทิ้งเลย เสมอหรือไม่

การใช้ยาหยดตาที่ถูกวิธีการหยดต้องรักษาความสะอาด ระวังไม่สัมผัสด้านในของขวดยา และไม่ให้ขวดยาสัมผัสนับตาหรือขนตา เมื่อหยดเสร็จควรเก็บยาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมด้า เมื่อยุ่นออกตู้เย็นต้องระวังไม่ให้ร้อนหรือถูกแดด สามารถเก็บยาไว้ใช้ได้ประมาณ 3 เดือน แต่ถ้าเป็นยาที่ใช้ในกรณีมีการอักเสบของตาหรือยาอันตราย เมื่อใช้ครบตามที่แพทย์สั่งแล้วไม่ควรเก็บไว้ใช้ต่ออีกครับ

การแพ้ยาหยดตา

ยาที่ใช้ในการหยดตา อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ เช่นเดียวกับยาที่ใช้โดยการกินหรือฉีด แต่อาการแพ้ยาหยดตาที่พบบ่อยมักมีอาการแพ้ที่บริเวณตา อาการแพ้จะทำให้มีอาการบวม แดง และคันทั้งในบริเวณดวงตา และเปลือกตาอย่างรุนแรง อาจเห็นเป็นถุงน้ำใสบริเวณเยื่อตาขาว มีน้ำตาไหลมาก โดยทั่วไปอาจพบได้ในผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ใช้ในการรักษาโรคตาแดง ซึ่งอาจพบได้ประมาณ 5-7 % ดังนั้นหากท่านหยดยาเก้อักเสบแล้วกลับมีอาการตาแดง คันตามากขึ้น อาจนำยาไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อดูว่าเป็นอาการแพ้ยาหรือไม่ และควรจะดัดจำชื่อยาที่แพ้เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่งใช้ในกรณีต่อไปครับ



น้ำยาล้างตา...จำเป็นแค่ไหน

คนไทยนิยมซื้อหน้ายาลังตาก้าร้านขายยาลังตาเองเป็นจำนวนมาก
จากหลายสาเหตุ แต่สิ่งที่เพิ่งจะรักษาได้คือหน้ายาลังตามากเป็นสารเคมีชนิดใด
ชนิดหนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาได้ ธรรมชาติได้ให้น้ำยา
ลังตาที่ดีที่สุดคือน้ำตา ดังนั้นเมื่อท่านเคืองตา รู้สึกว่ามีฝุ่นเข้าตา ห้ามขี้ยิ่งให้
พยายามกระพริบตาให้น้ำตาไหลออกมาก ล่วงมากจะสามารถล้างเศษฝุ่นออก
มาได้ ถ้าฝุ่นยังไม่ออกมาอาจใช้วิธีลิมตาในน้ำสะอาด ฝุ่นมักออกมากได้ ถ้ายัง
รู้สึกเคืองตาก็มากและฝุ่นยังอยู่ในตา แนะนำให้พบจักษุแพทย์เพื่อหยุดยาชา
และเขี่ยฝุ่นออกให้จะปลอดภัยต่อดวงตากา瓜



การกำใบขับขี่กับความพิดปกติทางตา

ปัจจุบันกรมการขันส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความผิดปกติทางตาสามารถยืนคำขอเมืองน้ำตกขับเข้ารถยนต์ได้ โดยมีเงื่อนไขต้องไม่มีภาวะตาบอดลี และหากมีตาพิการ 1 ข้าง ตาข้างที่ดีต้องสามารถอ่านตัวเลขที่ใช้ในการวัดสายตาได้อย่างน้อย 5 ແຄ้า (ความสามารถการมองเห็นเท่ากับ 20/40 พูต) และต้องมีลานสายตาในแนวนอนอย่างน้อย 120 องศา ในแนวตั้งอย่างน้อย 20 องศา หากมีข้อสงสัยควรพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยก่อนได้

ความพิดปกติทางตาคับ การเก็บทิชหาย

ในการเกณฑ์ทหาร ทางราชการจะมีการตรวจร่างกายผู้เข้ารับการเกณฑ์ เนื่องจากต้องการได้บุคลากรที่มีความพร้อมสมบูรณ์ ปัญหาทางตาเป็นปัญหาหนึ่งที่อาจทำให้ไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้มีหลายกรณีได้แก่ ตาข้างใดข้างหนึ่งมีระดับสายตาต่ำอยกว่า 3/60 (คือมองเห็นตัวเลขในแผ่นตรวจเพียง 1 ແລກที่ระยะห่าง 10 เมตร) หรือ atan สายตาแคบกว่า 10 องศา หรือตาหั้งสองข้างสั้นกว่า 8.00 ได้ออปเตอร์หรือยากว่า 500 ได้ออปเตอร์เป็นตันแต่อย่างไรก็ตาม การตรวจความผิดปกติดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในการเกณฑ์ทหารต้องตรวจจากจักษุแพทย์ในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามที่กำหนดไว้ท่านนั้น

